

Samenstelling

kokosolie (geraffineerd), eiproducten (gedroogd), plantaardig vet (geraffineerd, koolzaad).

Analytische bestanddelen

Ruw eiwit.....	6,30%
Ruw vet.....	89%
Ruwe celstof.....	0%
Ruwe as.....	2,30%
Vocht.....	0,87%
Natrium.....	0,03%
Lysine.....	0,47%
Methionine.....	0,17%

Toevoegingsmiddelen per liter

Vitaminen

3a672b Vitamine A.....	170.000 IE
3a700 Vitamine E.....	3.750 mg
3a700ii Vitamine E.....	200 mg

Conserveermiddelen

1a330 Citroenzuur.....	100 mg
------------------------	--------

Antioxidanten

1b320 Butylhydroxyanisool.....	230 mg
E 310 Propylgallaat.....	230 mg

Darmflorastabilisatoren

4b1700i Bacillus licheniformis (DSM 5749), Bacillus subtilis (DSM 5750) in verhouding 1:1 40 x 10⁹ KVE/kg

Gebruiksaanwijzing en dosering

Schudden voor gebruik.

Pasgeboren biggen: 2-4 ml (1-2x pompen) oraal toedienen direct na de geboorte. Bij zwakke biggen nogmaals 2 ml oraal toedienen op dag 2.

Het gelijktijdige gebruik van verschillende organische zuren of zouten daarvan is gecontra-indiceerd wanneer een of meer daarvan aan of nabij het maximaal toegestane gehalte worden gebruikt.

Bewaaradvies

Sluit de verpakking na gebruik goed af. In gesloten verpakking op een droge, koele en donkere plaats bewaren.

Erkenningsnr. Producent

No agrément du producteur

α DE NI 400036

PDV103322

GMP+FSA geborgd

Garanti GMP+FSA

GMO controlled



250 ml

Kick

Vloeibaar aanvullend diervoeder voor biggen

Aliment complémentaire liquide pour les porcelets



Composition

Huile de coco (raffinée), poudre d'oeuf, graisse végétale (huile de colza et de palme).

Constituants analytiques

Protéines brutes.....	6,30%
Matières grasses brutes.....	89%
Cellulose brute.....	0%
Cendres brutes.....	2,30%
Humidité.....	0,87%
Sodium.....	0,03%
Lysine.....	0,47%
Méthionine.....	0,17%

Additifs par litre

Vitaminen

3a672b Vitamine A.....	170.000 UI
3a700 Vitamine E.....	3.750 mg
3a700ii Vitamine E.....	200 mg

Conservateurs

1a330 Acide citrique.....	100 mg
---------------------------	--------

Antioxydants

1b320 Hydroxyanisole butylé....	230 mg
E 310 Gallate de propyle.....	230 mg

Stabilisateurs de la flore intestinale

4b1700i Bacillus licheniformis (DSM 5749), Bacillus subtilis (DSM 5750) en rapport 1:1 40 x 10⁹ UFC/kg

Mode d'emploi et dosage

Agiter avant utilisation.

Porcelets nouveau-nés: administrer 2-4 ml (1-2x pompage) par voie orale immédiatement après la naissance.

Pour les porcelets faibles, administrer 2 ml supplémentaires par voie orale le deuxième jour.

L'utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu'un ou plusieurs d'entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.

Conditions de stockage

Fermer l'emballage hermétiquement après utilisation. Conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière.

Chargenr.

Ten minste houdbaar tot /

Date de durabilité

Topro: registered trademark of

Farmula
farming forward

Farmula B.V.

Sluiskolk 3-5

7681 KC Vroomshoop NL

info@topro.nl www.topro.nl