



Vermindert het risico op tetanie  
Reduces the risk of tetany  
Reduziert das Risiko von Tetanie  
Réduit le risque de tétanie

30 dagen | 30 days

# magnesium

12 x 95 g



## NL

Mineraal dietvoeder voor rundvee in de vorm van een bolus voor orale toediening, ter vermindering van het risico van tetanie (hypomagnesemie of kopziekte).

### Afgifteduur

Geleidelijke afgifte gedurende 30 dagen.

### Samenstelling

Magnesiumoxide, plantaardige vetten van koolzaad, calciumstearaat.

### Analytische bestanddelen

Magnesium .....	43,0%
Kalium .....	<0,1%
Natrium .....	<0,1%
Fosfor .....	<0,1%
Calcium .....	2,5%
Zetmeel .....	<0,4%
Suikers (totaal) .....	6,0%

## Dosering

- 2 bolussen in één keer ingeven bij het uitweiden in de lente.
- Indien nodig kunnen 1 maand later nog een keer 2 bolussen gegeven worden.
- Niet toedienen aan runderen beneden de 250 kg.

### Gebruiksaanwijzing

- Toedienen met een geschikte bolusschieter (folie verwijderen).
- Aanbevolen wordt om voor gebruik het advies van een dierenarts of voederdeskundige in te winnen met betrekking tot het evenwicht van het dagelijks rantsoen en de opname van vezels en gemakkelijk beschikbare energiebronnen.

## Bewaren

Koel, droog en buiten het bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen vorst.

### Elke bolus bevat 40 g magnesium.

### Tenminste houdbaar tot

Zie verpakking.

### Batchnr.

Zie verpakking.

## FR

Aliment minéral diététique pour bovins en forme de bolus pour administration orale, a fin de réduire le risque de tétanie (hypomagnésémie).

### Durée de libération

Libération progressive pendant 30 jours.

### Composition

Oxide de magnésium, matières grasses de colza, stéarate de calcium.

### Constituants analytiques

Magnésium .....	43,0%
Potassium .....	<0,1%
Sodium .....	<0,1%
Phosphore .....	<0,1%
Calcium .....	2,5%
Amidon .....	<0,4%
Sucres (total) .....	6,0%

## Dosage

- Appliquer 2 bolus en une seule fois lors du pâturage au printemps.
- Si nécessaire administrer encore une fois 2 bolus 1 mois plus tard.
- Ne pas administrer au bétail de moins de 250 kg.

### Mode d'emploi

- Appliquer avec un lancebolus adapté (retirer le film).
- Avant l'utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire ou d'un expert en nutrition animale en ce qui concerne l'équilibre de la ration journalière et l'inclusion de fibres et les sources d'énergie disponibles facilement.

## Conserver

Conserver frais et sec, hors de portée d'enfants. Protéger contre le gel.

### Chaque bolus contient 40 g de magnésium.

### Date limitée de conservation

Voir emballage.

### No de lot

Voir emballage.

## EN

Dietetic mineral feed for cattle in the form of a bolus for oral administration, to reduce the risk of tetany (hypomagnesemia or grass tetany).

### Release duration

Gradual release over 30 days.

### Composition

Magnesium oxide, vegetable fat from rapeseed, calcium stearate.

### Analytical constituents and amounts

Magnesium .....	43,0%
Potassium .....	<0,1%
Sodium .....	<0,1%
Phosphorus .....	<0,1%
Calcium .....	2,5%
Starch .....	<0,4%
Sugars (total) .....	6,0%

## Dosage

- Administer 2 boluses at the same time when pasture in spring.
- If necessary, administer 2 more boluses 1 month later.
- Not to be used for cattle lighter than 250 kg.

### Instructions for use

- Administer with a suitable bolus applicator (remove foil).
- We recommend consulting a veterinarian or nutritionist in relation to balanced daily feed rations and the absorption of fibres and readily bioavailable energy sources.

## Storage instructions

Keep product cool, dry and out of reach of children. Protect against frost.

### Each bolus contains 40 g magnesium.

### Best before

See packaging.

### Batch No.

See packaging.

## DE

Diätetisches Mineralfuttermittel für Rinder in Form eines Bolus zur oralen Verabreichung, zur Verringerung der Gefahr von Tetanie (Hypomagnesemia).

### Veröffentlichungsdauer

Allmähliche Freigabe über 30 Tage.

### Zusammensetzung

Magnesiumoxid, Rapsöl, Calciumstearat.

### Analytische Bestandteile

Magnesium .....	43,0%
Kalium .....	<0,1%
Natrium .....	<0,1%
Phosphor .....	<0,1%
Calcium .....	<2,5%
Stärke .....	<0,4%
Zucker (gesamt) .....	6,0%

## Fütterung

- 2 Boli gleichzeitig verabreichen bei der Beweidung im Frühjahr.
- Falls erforderlich 1 Monat später wieder 2 Boli verabreichen.
- Nicht verwenden bei Tieren unten 250 kg.

### Gebruiksaanwijzing

- Verfütterung mit einem geeigneten Bolus-Applikator (folie entfernen).
- Es wird empfohlen vor der ersten Anwendung den Rat eines Futtermittelexperten einzuholen zu der Ausgewogenheit der täglichen Ration und die Aufnahme von Faser und leicht verfügbaren Energiequellen.

## Lagerungshinweise

Kühl, trocken und außer Reichweite von Kindern lagern. Vor Frost schützen.

### Jeder Bolus enthält 40 g Magnesium.

### Mindestens haltbar bis

Siehe Verpackung.

### Batch-Nr.

Siehe Verpackung.



12 x 95 g

# Magnesium

30 dagen

30 days

Topro: registered trademark of

**Farmula**<sup>v</sup>  
farming forward

Farmula B.V.

Sluiskolk 3-5

7681 KC Vroomshoop NL

info@topro.nl www.topro.nl

Erkenningsnr. Producent  
Registration No. manufacturer  
Zulassungs-Nr. Hersteller  
No agrément du producteur  
αFR24037002

GMP+ FSA geborgd  
GMP+ FSA assured  
GMP+ FSA gesichert

Garanti GMP+ FSA  
GMO controlled  
PDV103322



 **topro**  
animal health



1



2



3